

Melanomlaufblatt Nachkontrollschema

Datum Primärexzision: Lokalisation:

Nachexzision: Sicherheitsabstand:

Melanom-Typ: Breslow: Clark Level: T N M

Histologie-Nrn.: Foto-Nrn.:

Verlauf (Metastasen)

inkl. Operationen):

Breslow Stadium	≤1 mm IA (ohne Ulcus/pT1a)	1-4mm (≤1mm mit Ulcus/ IB-IIB pT1b oder >1mm)	>4mm (ab 4mm IIC-IV mit Ulcus)	Datum	Therapie
Eingang	A	A, C, E	A, C, D, E, (F, G)		
1	3	A, E	A, C, E		
	6	A	A, C, E		
	9		A, E		
	12	A	A, C, E		
2	15		A, E		
	18	A	A, C, E		
	21		A, E		
	24	A	A, C, E		
3	27		A, E		
	30	A	A, C, E		
	33		A, E		
	36	A	A, C, E		

A: Ganzkörperinspektion (Haut und einsehbare Schleimhäute, Dermatoskopie, Lymphknotenabflusswege und -stationen, Lungenauskultation und Inspektion/Palpation der Narbe)

C: Sonographie lokoregionäre Lymphknoten

D: PET-CT oder andere Schnittbildgebung

E: S100β (MIA)

F: MRI Schädel

G: LDH

ab Stadium IIB: bRAF-Mutation (alle Melanome)

c-KIT-Mutation (ALM und Schleimhautmelanome, ausser vaginal)

Eingangsstaging bei Stadium IV: ev. zusätzlich Knochen-Szintigraphie und Sonographie Abdomen

Bei unklarem Primärtumor ist keine Suche nach dem extracutanen Primärtumor empfohlen.

Fortsetzung Rückseite →

		≤1 mm IA (ohne Ulcus/pT1a)	1-4mm (≤1mm mit Ulcus/ IB-IIIB pT1b oder >1mm)	>4mm (ab 4mm IIC-IV mit Ulcus)	Datum	Therapie
4	39			A		
	42		A	A, C, E		
	45			A		
	48	A	A, C, E	A, C, E		
5	51			A		
	54		A	A, C, E		
	57			A		
	60	A	A, C, E	A, C, E		
6	63					
	66			A		
	69					
	72	A	A	A, E		
7	75					
	78			A		
	81					
	84	A	A	A, E		
8	87					
	90			A		
	93					
	96	A	A	A, E		
9	99					
	102			A		
	105					
	108	A	A	A, E		
10	111					
	114			A		
	117					
	120	A	A	A, E		

weiter lebenslänglich jährliche klinisch-dermatologische Kontrollen

A: Ganzkörperinspektion (Haut und einsehbare Schleimhäute, Dermatoskopie, Lymphknotenabflusswege und -stationen, Lungenauskultation und Inspektion/Palpation der Narbe

C: Sonographie lokoregionäre Lymphknoten

E: S100β (MIA)